

令和5年 アメダスデータによる葉いもちの感染好適条件の推定結果

	飛	酒	鶴	狩	鼠	差	金	新	向	肘	尾	村	大	左	山	長	小	高	高	米
	島	田	岡	川	関	鍋	山	庄	町	折	花	山	井	沢	形	井	国	畠	峰	沢
5月31日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月1日	-	4	1	-	1	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	4	1
6月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6月3日	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	?	-
6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月8日	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
6月9日	-	●	-	-	-	1	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月11日	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	●	●	1	1	●	1	-	●	4	●
6月12日																				

表の見方:葉いもち感染は、夕方から翌日の朝までに起こることから、記号は2日にまたがって表示しています。

- : 感染好適条件(葉面湿潤時間10時間以上、平均気温15~25℃、前5日間の平均気温20~25℃)
- 1: 準感染好適日(前5日間の平均気温が20℃未満)
- 2: 準感染好適日(前5日間の平均気温が25℃以上)
- 3: 準感染好適日(湿潤時間中の平均気温が15℃未満、25℃以上)
- 4: 準感染好適日(湿潤時間中の平均気温毎に必要な湿潤時間より短い)
- : 感染好適なし
- ?: 判定不能