

# 稲作だより

緊急号  
いもち対策 編

令和5年7月 19 日発行  
山形おいしさ極める！米づくりプロジェクト  
最上地域本部  
最上総合支庁農業技術普及課  
Tel 29-1329 (稲作担当)

## 葉いもちの蔓延に注意！ 早期発見、早めの薬剤防除を！

### 圃場を見回り早期発見を！

管内では、7月以降、葉いもちの感染好適条件となる日が複数日出現しており（表1）、葉いもちの多発圃場が増えています。

生産者の皆さん、早急に圃場を見回り、発生状況を確認しましょう。

### 発見後直ちに薬剤防除を！

収量・品質の低下に繋がる穂いもちの発生を防ぐには、感染源となる葉いもちの上位葉への進展を防ぐことが重要です。予防粒剤を使用した場合でも、発生を確認したら、直ちに表2のような薬剤による防除を行いましょう。また、前もって計画している無人ヘリ等での防除日まで期間が空いている場合は、追加防除が必要です。

なお、薬剤の散布に際して、穂いもちの共同防除計画等を確認し、使用回数が基準を超えないよう注意しましょう。

表1 葉いもちの感染好適日

月日	差首鍋	金山	新庄	向町	肘折
7/6	●	●	—	●	●
7/7	—	—	—	—	—
7/8	—	—	—	—	—
7/9	—	—	—	—	—
7/10	●	●	—	—	●
7/11	—	—	—	—	—
7/12	●	—	●	—	—
7/13	—	—	—	—	?
7/14	—	—	—	—	—
7/15	—	●	—	●	●
7/16	—	—	—	●	—
7/17	●	●	—	●	●
7/18	●	—	—	—	—

●が感染好適条件。

BLASTAMによる推定。



写真1 葉いもちの病斑  
(最上町、「あきたこまち」、7/10)

表2 葉いもち防除薬剤と有効成分ごとの使用回数の例

薬剤名	有効成分（本田での使用回数）			
ノンプラス粉剤DL	トリシクラゾール（3回以内）	フェリムゾン（2回以内）	フサライド（3回以内）	
ブラシン粉剤DL	フェリムゾン（2回以内）	フサライド（3回以内）		
ブラシンフロアブル	フェリムゾン（2回以内）	フサライド（3回以内）		
ダブルカット粉剤3DL	カスガマイシン（2回以内）	トリシクラゾール（3回以内）		
ダブルカットフロアブル	カスガマイシン（2回以内）	トリシクラゾール（3回以内）		
カスミン液剤	カスガマイシン（2回以内）			



### 農薬のドリフト（圃場外への飛散）に注意！

農薬を使用する際はドリフトに十分注意しましょう。  
特に、風の強い日はドリフトの危険性が高まります。