

稲作だより

第5号


令和6年5月21日発行
山形おいしさ極める！
米づくりプロジェクト
西村山農業技術普及課
TEL：0237-86-8287

**5月下旬の気温は高めで推移する予報！
除草剤の散布遅れとワキに注意しましょう！**

本田の初期管理

1. 水管理

- ・田植え後は、活着するまで**水深4～5cm程度**にして根の発生を促しましょう。
- ・活着したら、**水深2～3cmの浅水**で水温を高め、分げつ発生を促しましょう。
- ・**日中は止水**にし、できるだけ水温を高めましょう。
- ・入水は、**夜間か早朝**に行いましょう。
- ・強風や低温が続くときは、水深をやや深めにして稲体を保護しましょう。



2. 除草剤の施用

- ・散布時の水深は、粒剤、フロアブル剤が**3～5cm**、ジャンボ剤、豆つぶ剤が**5～6cm**としましょう。
- ・田面が露出すると、除草効果が劣るため、**散布後7日間**は止水し、田面の露出を防ぎましょう!!
- ・**雑草の葉齢はイネより生育が早い**ため、散布遅れに注意!!

3. 藻類・表層剥離への対策

- ・藻類・表層剥離の発生が激しい場合は、イネの倒伏、生育抑制、除草剤の効果が低下するなどの影響が見られます。
- ・藻類・表層剥離の発生が激しい場合は、一発処理除草剤の散布前に数日間落水しましょう。



表層剥離の発生した圃場


LINE を活用した情報提供を行っています。

QRコードを読み取り登録の上、ぜひご活用ください！



4 土壌の異常還元対策

- ・高温多照が続くと、土壌が還元して根の生育を妨げるガスが発生します（ワキ）。ワキが発生すると、**根の活力が低下**し、**葉が黄化**して**生育が停滞**します。
- ・**土壌の異常還元（ワキ）がみられる場合は、水管理による対策**を行いましょう。
- ・高温多照が数日続く場合は、2~3日おきに、用水の入替えを行い、根に酸素を供給しましょう。
- ・毎年ワキが発生する圃場では、**一発処理除草剤の散布前に田干し(1~2日程度落水)**を行い、ワキの発生を防ぎましよう!!



病虫害対策

○いもち病対策

- ・取置き苗はいもち病の伝染源となるため、**補植後直ちに処分**しましょう！
- ・育苗箱施用薬剤を散布していない場合は、**6/20まで**に予防剤を散布しましょう！



取置き苗は直ちに処分

○斑点米カメムシ類対策

- ・斑点米カメムシ類は、水田周辺の雑草地で増殖します！日頃から雑草管理を徹底しましょう！
- ・水田内や周辺に雑草が生い茂らないよう、水田内の除草、**畦畔の草刈り**や休耕田の耕耘等の雑草対策を徹底し、斑点米カメムシ類の発生源を減らしましょう!!

春季農作業事故防止運動強化期間(4/1~6/10)

- ◎春作業等におけるトラクターの転落・転倒事故を防止しましょう！
- ◎農薬は、ラベルをよく読んで適正に使用しましょう！