

いいもの成らせるさくらんぼ便り

Vol. 6 「適期収穫の徹底」と「出荷規格の遵守」

◆今年の生育は、早かった前年よりさらに**2日程度早い!**
 熟度が進んできている。**適期内に収穫できるよう、作業は早めに!**

1 本年産の特徴

■「佐藤錦」の収穫時期の目安（4/20に満開の場合）

収穫始期（満開後50日）	収穫盛期（満開後55日）	収穫終期（満開後60日）
6/9頃	6/14頃	6/19頃

- ・「**紅さやか**」の収穫盛期は前年より**2日**、**平年より6日早い**（山形園研）
- ・5月下旬の気温が低かったため、各品種とも着色・熟度が進んできている

2 出荷時の注意点

着色不良果（50%未満）・S級は生食用として出荷しない!!

- ・大きさ：**M級（果実横径19mm）以上**のものを出荷 <全ての品種>
- ・着色：**「佐藤錦」「紅秀峰」ともに50%以上**
- ・**「軽微な裂果」や「病害虫果」、「双子果」の混入に注意**

生食出荷規格（佐藤錦）



特秀品（70%以上）



秀品（60%以上）



丸秀品（50%以上）

3 高温・乾燥への対応

6月後半は高温予想（気象庁1か月予報：5/30発表）

- ・日中、葉に萎れが見られたら、**地面に少量かん水(1~2t/10a)**
- ・着色が進んだら、**収穫前に反射シートを撤去**
- ・熟度が進みやすい**枝先や樹勢が弱い樹から収穫**
- ・萎び果等が見え始めたら、直ちにガウもぎする



萎び果

4 病害虫防除

- ◎オウトウショウジョウバエ：初確認が早く、発生量も多い（県病害虫防除所）
 裂果で収穫しなかった露地圃場がある場合、**今後の発生拡大が懸念されるため、防除を徹底し、適切に処分**
- ◎灰星病、オウトウショウジョウバエの防除徹底
 裂果が見られる園地等では、**防除間隔を短めに**

★ 慌てず、焦らず、農作業は『安全第一』!

高所作業に注意! 水分補給やこまめな休憩で「熱中症」を予防しましょう!