

登熟進む！刈取り適期に入っています！

すぐに圃場で青粃歩合、粃水分をチェック！！

品質最優先！刈り始めが遅くならないように注意！

1 登熟の推移

生育診断圃の 9 月 2 日現在の登熟歩合は、「はえぬき」「雪若丸」で 90% 近くに達しています。青粃歩合は 26% 程度、粃水分は 26～27% まで低下しており、**現時点で刈取り適期に入っていると見込まれます。**



写真 粃と玄米（酒田市荻島「はえぬき」） 玄米は 1.9mm 以上




図 暦日と登熟歩合、青粃歩合の推移（酒田市荻島「はえぬき」）

生育診断圃の登熟状況（9 月 2 日現在）

（ ）は平年差

品種	出穂期	青粃歩合	粃水分	登熟歩合	積算気温
酒田市荻島 はえぬき	7/30 (-2日)	27.0% (-24.4)	26.7%	89.7% (+13.7)	933℃ (+46)
酒田市前川 雪若丸	7/30 (-3日)	25.5% (-39.4)	26.4%	85.3% (+16.8)	933℃ (+113)
酒田市漆曽根 つや姫	8/9 (+1日)	96.9% (+13.1)	30.6%	28.1% (-17.7)	651℃ (-18)

2 適期刈取り

「はえぬき」「雪若丸」では、刈取り適期に入っていると見込まれます。

刈取り適期の目安は下表のとおりです。刈始め時期は、積算気温を目安に、圃場の籾数の多少、枝梗の黄化、青籾歩合、籾水分等から総合的に判断しましょう。

刈遅れによる品質低下（胴割れ粒の多発、茶米の増加、光沢の低下など）にならないよう、刈取晩限内に刈取りしましょう！

出穂後の平均気温の積算から予想される刈取り適期の目安（平坦部）

品種	出穂期	9/3 現在 積算気温	刈取り適期 積算気温の範囲	刈取り適期の目安		
				期間(月/日)	刈り始め 青籾歩合	籾水分
はえぬき	7/30 頃	933℃	900℃ ～1,150℃※	9/1～9/10	20%	25% 以下
雪若丸					15～20%	
つや姫	8/9 頃	651℃	950℃ ～1,150℃※	9/14～9/22	15%	

※モデル酒田市平坦部：本年値は9月2日まで 9月3日～9月24日は予測値（気象庁予測による平年差を用いて算出）、以降平年値を用いて積算したもの

※高温登熟年次の刈取適期は、「はえぬき」「雪若丸」は900℃～1,150℃、「つや姫」は950℃～1,150℃となる

3 乾燥・調製

- 高温時に籾をフレコン袋や搬送機に放置すると、着色米（ヤケ米）の原因になります。
収穫後は速やかに乾燥機に張り込み、乾燥開始まで循環、常温通風しましょう。
- 高水分籾は、初期に常温通風乾燥を行い、粒間の水分ムラを少なくした後、通常の送風温度に上げて乾燥を行いましょう。急激に乾燥すると胴割れしやすくなるので注意が必要です。
- 籾すりは必ず品種ごとに試しずりを行い、ロール幅の調整等を行いながら、「砕け」「肌ずれ」の発生を防止し、高品質米に仕上げましょう。
- 仕上げの玄米水分が高いと脱ぶ率は低下し、肌ずれも増加します。
適正な玄米水分（14.5～15.0%）であることを確認し、過乾燥に注意しましょう。

「スマートつや姫」


刈取適期マップ（9/5 更新予定）

- ◎刈取り順番を色分けで表示
- ◎刈取晩限の目安がわかる

適期刈取りの参考にしましょう！



「スマートつや姫」
アクセスはこちら



米づくり情報 次号 9月11日頃 発行予定
（9/9 登熟調査結果 **速報**）

酒田普及課 LINE
からも受け取れます
友だち登録こちら→

