

おいしい果実を届けよう！

「ラ・フランス」だより

Vol.2 カメモシ・輪紋病対策を徹底しよう！



1. カメモシの発生量は、「平年より多い」

◇ 気温が高まった6月4半旬から発生量が急増

・ 向こう1か月の天候は気温が高い予報↳ 活動の活発化で被害増加の恐れあり・ 成幼虫や卵塊を見かけ次第捕殺・ 散布間隔をあけないように、概ね10日間隔でシンクイムシ類と同時防除を実施

※薬剤の選択はお近くの農業技術普及課にご相談ください




図 クサギカメモシの誘殺推移

2. 輪紋病の重点防除時期です

◇ 輪紋病が多発した昨年度の発生要因：7月中の降水量
(平年比 150～170%)

	6月			7月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
輪紋病						
胴枯病						

重点防除時期

・ 薬剤散布の間隔は **10日以内！**・ 降雨が続く時は、積算降水量が100mmになる前に散布

GI「山形ラ・フランス」の取組みにご協力ください



山形県「ラ・フランス」振興協議会は、
GI「山形ラ・フランス」の生産・出荷を推進しています
未入会の方は、ぜひご入会を！
取組みや入会方法の詳細は、県HPをご覧ください ▶



※ご不明な点は、所属する出荷団体または下記連絡先まで

Q ラ・フランス情報

検索

山形県「ラ・フランス」振興協議会

【作成】山形県農林水産部園芸大国推進課・農業技術環境課(TEL:023-630-2249)