

すでに刈取適期を迎えている圃場アリ！ 黒化率を確認して収穫を行いましょう

1. 収穫適期

◎播種が早かった圃場、着粒数が少ない圃場では既に刈取適期となっている場合があります。

◎コンバイン収穫の収穫適期は、黒化率70～80%
(子実全体の70～80%が黒褐色に変化した時期)
です。

◎黒化率が高すぎると脱粒による収穫ロスが多
くなります。

◎黒化率が低すぎると水分が多く、子実と茎葉の分
離が難しくなります。

◎播種が遅れた圃場でも圃場条件や生育等により
結実が進んでいる場合があります。圃場をよく観
察して、適期に収穫を行いましょう！



図1 刈取適期を迎えている圃場
(撮影：R7 10/2 村山市)



図2 収穫適期の花房
(撮影：R6 10/10 尾花沢市)

2. 乾燥・調整

◎収穫後の急激な高温乾燥は、風味の低下につながるため、避けましょう。

◎乾燥温度の目安は、外気温+10℃かつ30℃以下です。

◎毎時、乾減率が1%を超えないよう通風温度を調整しましょう。

秋の農作業事故防止運動実施中！

(9月1日～10月31日)

刈払い機、コンバイン等の点検は、必ずエンジンを停止してから！
コンバインでの田んぼへの進入、退出時は特に注意しましょう！