

刈取りをペースアップ！！

刈遅れは胴割粒や茶米が急増！

山形おいしさ極める！米づくりプロジェクト本部


「つや姫」の刈取適期の晩限が近づいています！

刈り遅れると胴割粒や茶米が急激に増加し、品質低下につながります。

農作業事故に十分注意しながら、早目に「つや姫」の刈取りを終えるようにしましょう。

刈取り後は、水分の戻りに注意しながら二段乾燥や夜間休止を行うなど、ゆっくり・丁寧な乾燥を行って、胴割粒の発生を防ぎましょう。また、整粒歩合を確保するため、適切な選別網目を使用するとともに、色彩選別機を積極的に利用し、白未熟粒、部分着色粒、茶米、青死米を全て除去して最上級の1等米に仕上げましょう。

刈遅れで増加する被害粒



胴割粒

茶米

斑点米カメムシ類による被害



部分着色粒

落等要因となる死米



青死米

乾燥調製時のミスで増加する被害粒



肌ずれ(はく皮粒)

砕粒




図2 「つや姫」の胴割粒歩合の推移 (H22、農総研セ m²収数2.8~3.5 万粒)

図1 刈遅れや乾燥調製時のミスで増加する被害粒、落等要因となる形質の例 (農林水産省HP)

農作業事故に十分注意してください！

農作業は休憩と水分を十分にとりながら、余裕を持って複数人数で行いましょう。コンバイン使用時等、収穫作業における重大事故に注意しましょう。 **STOP農作業事故！**