

43 麦類・大豆奨励

(1) 小麦

早晩性	品 種 名	来 歴 (育成場所) 育 成 年	採 用 年 次	供 試 年 次	は 種 期 月 日	出 穂 期 月 日	成 熟 期 月 日	稈 長 cm	穂 長 cm	穂 数 本/m ²
中生	[認定品種] ナンプコムギ	農林33号×農林27号 (盛岡農改実) 昭和26年	昭和 56年	平10 ～12	10月 1日	5月 13日	6月 24日	105	9.9	480
中生	[認定品種] ゆきちから	東北141号×さび系23号 (東北農業研究センター) 平成14年	平成 19年	平13 ～16	10月 1日	5月 13日	6月 25日	88	8.3	521

(2) 大豆

早晩性	区 分	品 種 名	来 歴 (育成場所) 育 成 年	採 用 年 次	供 試 年 次	は 種 期 月 日	開 花 期 月 日	成 熟 期 月 日	生 態 型	主 茎 長 (cm)	分 枝 数 (本)	主 茎 節 数
中晩生	大粒 白目	[奨励品種] 里のほほえみ	東北129号×刈交0264MYF ₆ (東北農業研究センター) 平成20年	平成 21年	平19 ～20	6月 8日	8月 1日	10月 17日	Ⅱ c	72.0	4.7	15.2
中晩生	中粒 白目	[優良品種] タチユタカ	房成×刈系92号 (東北農試) 昭和62年	昭和 62年	平10 ～12	6月 3日	8月 1日	10月 12日	Ⅱ c	58.0	4.1	16.8
中生	大粒 白目	[優良品種] リュウホウ	スズユタカ×刈交343F ₇ (東北農試) 平成7年	平成 13年	平12 ～14	6月 5日	7月 26日	10月 4日	Ⅱ b	45.0	4.0	12.2
中生	極小粒 白目	[優良品種] すずかおり	刈交778F ₅ ×コスズ (東北農試) 平成13年	平成 15年	平12 ～15	6月 5日	8月 3日	10月 8日	Ⅱ c	57.0	5.9	15.5
中生	大粒 白目	[優良品種] シュウリュウ	東北143号×刈系675号 (東北農業研究センター) 平成25年	平成 26年	平22 ～25	6月 5日	7月 28日	10月 4日	Ⅱ b	54.4	4.3	14.9
中生	大粒 白目	[認定品種] エンレイ	農林2号×東山6号 (長野中信農試) 昭和46年	平成 17年	平12 ～14	6月 5日	7月 29日	10月 7日	Ⅱ b	66.0	5.0	14.4

注：※はH14～H16の平均値

品 種 等 の 特 性 表

芒 の 長 短	株 の 開 閉	穂 発 芽 性	脱 粒 性	播 性 程 度	玄 麦			質 の 硬 軟	品 質	抵 抗 性				
					10 ^a 収 当 量 (kg)	千 粒 重 (g)	容 積 量 (g/斗 ^リ ル)			耐 寒 雪 性	耐 倒 伏 性	耐 肥 性	凍 抵 霜 抗 害 性	さ び 病
短	中	難	難	V	511	41.8	827	軟	中 の 中	強	やや強	強	強	中
極短	中	中	難	V	444	39.9	795	硝子質	中 の 下	強	強	強	強	強

草 型	伸 育 型	毛 茸 の 色	花 色	熟 莢 色	裂 莢 性	子 実						粗 蛋 白 質 %	粗 脂 肪 %	品 質	耐 倒 伏 性	病害虫抵抗性		
						10 ^a 収 当 量 (kg)	百 粒 重 (g)	粒 形	裂 皮	種 皮 色	臍 色					ウ イ ル ス 病	紫 斑 病	ダ イ ズ シ ス ト ウ
閉鎖主茎型	有限	白	白	褐	難	337	37.2	扁球	難	黄白	黄	44.9	20.3	上 の 下	強	強	強	弱
閉鎖主茎型	有限	白	紫	暗褐	難	324	26.4	扁球	難	黄白	黄	※ 42.3	※ 21.4	上 の 中	強	極強	中	中
閉鎖主茎型	有限	白	紫	褐	中	304	29.4	楕円形	難	黄白	黄	※ 43.9	※ 19.9	中 の 上	強	A B 強 C D 弱	中	強
開張分枝型	有限	白	紫	淡褐	中	340	11.2	球	難	黄白	黄	40.5	20.4	中 の 上	強	極強	やや強	弱
閉鎖主茎型	有限	白	紫	淡褐	やや易	326	30.3	球	難	黄白	黄	43.2	20.4	中 の 上	強	強	強	弱
開張主茎型	有限	白	紫	褐	中	359	31.4	球	難	黄白	黄	44.5	18.9	上 の 下	中	A B 強 C D 弱	中	弱