

東南村山 おいしい米づくり情報

号外 斑点米カメムシ類補完防除 編

発行：令和 8 年 8 月 25 日

やまがた温暖化対応米づくり日本一運動村山地域本部

村山総合支庁農業技術普及課

(TEL：023-621-8295)

水田内で **斑点米カメムシ類** が多く確認されています！ 薬剤の収穫前使用日数等を厳守して**補完防除**を実施！！

- 山形県病害虫防除所が 8 月 17 日～19 日に実施した「**村山地域の水田内におけるすくい取り調査**」では、斑点米カメムシ類の平均すくい取り虫数は **4.8 頭（平成 1.1 頭）**と多い状況でした。
- 本年は 7 月中旬～下旬が日照不足であったことから**割れ粳の発生が多くなる恐れ**があり、その結果、斑点米が多くなることが懸念されます。
このため、例年、斑点米の発生が多い圃場を中心に、補完防除を検討してください。
- 補完防除を実施する場合は、「**収穫開始時期**」を考慮するなど、以下を参考にしてください。

補完防除の時期・薬剤

- 穂揃期 7～10 日後の薬剤散布（基本防除の 2 回目）を行った圃場では、「**基本防除 2 回目の 7～10 日後**」に補完防除を行います。
- 「**薬剤の使用基準をよく確認**」し、収穫前使用日数を厳守しましょう。
- 補完防除の散布薬剤例（いずれも収穫 7 日前まで）
スタークル粉剤 DL 3 kg／10a、スタークル液剤 10 1,000 倍
ダントツ粉剤 DL 4 kg／10a、ダントツ水溶剤 4,000 倍



【アカスジカスミカメ】



【アカヒゲホソミドリカスミカメ】

秋の農作業事故防止運動が始まります（9 月 1 日～10 月 31 日）
農作業事故と熱中症に十分注意して作業しましょう！