

稲作だより

第13号 刈遅防止編

令和8年9月25日


やまがた温暖化対応米づくり日本一運動最上地域本部 最上総合支庁農業技術普及課 ☎0233-29-1330

「はえぬき」「雪若丸」は刈取の晩限、「つや姫」は刈取の適期に入ります！

※お天気ニュース※

9/26～10/2 は平年に比べ曇りや雨の日が多く、10/3～10/9 は曇りや雨の日が少ないでしょう。天気をこまめに確認して適期刈取に努めましょう。(9/24 気象庁発表)

◎つや姫の登熟状況（作況圃（舟形町）：8/24、8/31、9/7、9/14 調査）



・9/7 までの登熟は平年よりやや遅れましたが、9/14 時点で平年並みに登熟は進んでいます。

出穂後の積算気温や青籾歩合、籾水分等を加味して総合的に刈取適期を判断し、計画的に作業を進めましょう。


◎刈取適期（9月24日現在）

地帯	品種名	出穂期	出穂30日間の平均気温(°C)	刈取適期積算気温の範囲	刈取適期の目安	青籾歩合(%)
平坦	はえぬき	8/5	24.9	950°C～1,200°C	9/15～9/26	20
	雪若丸	8/5	24.9	950°C～1,200°C	9/15～9/26	15～20
	つや姫	8/13	23.9	1,000°C～1,200°C	9/28～10/9	15
中山間	はえぬき	8/8	23.5	950°C～1,200°C	9/21～10/4	20

※平坦は新庄、中山間は向町のアメダスデータによる（9月23日までは本年実況値、以降「やまがた米づくりナビ」による予測値）。
※各圃場の生育や今後の気象経過により、刈取適期は変動することがあります。

◎刈遅れに注意しましょう！

・刈遅れは胴割粒（中心に亀裂）や茶米、奇形粒の発生するリスクが増えます。また、外観品質が低下するだけでなく、食味も低下する恐れがあります。圃場全体の稲株が完全に黄化するのを待ってからの刈取は刈遅れとなるため、注意しましょう。



左：胴割粒

右：整粒

農作業事故に注意しましょう！

9月1日から10月31日は「秋季農作業事故防止運動強化期間」です。

STOP！農作業事故

